

FR QUICK LYTE possède une **formule concentrée en électrolytes** et du magnésium assurant le bon fonctionnement musculaire. Appétent, il réhydrate et tonifie le cheval rapidement et est recommandé après toute situation ayant entraîné une sudation et/ou une fatigue : entraînement, compétition, course, épreuve d'endurance, randonnée, transport, chaleur excessive, stress. Convient également aux chevaux âgés (dès 16 ans) qui, par fortes chaleurs, peuvent manquer d'électrolytes et se déshydrater.

COMPOSITION : Dextrose, Chlorure de sodium, Phosphate monopotassique, Sels de potassium d'acide citrique, Oxyde de magnésium.

ADDITIFS : Conservateurs : Acide citrique (1a330) 7500 mg/kg. Substances aromatiques : mélange de substances aromatiques.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines brutes 0,2%. Matières grasses brutes 0%. Cellulose brute 0%. Cendres brutes (mat. minérales) 29%. Chlorures 18,2%. Calcium 0,01%. Sodium 6,3%. Glucose 63%. Magnésium 0,5%. Potassium 3,3%, phosphore 3%.

MODE D'EMPLOI : Diluer QUICK LYTE dans 2 à 4 litres de la première eau de boisson. Eau disponible en permanence.

Durée d'utilisation recommandée : 1 à 3 jours après forte sudation.

Il est conseillé de contrôler la consommation d'eau ultérieure, si une consommation d'eau insuffisante est observée, il conviendrait de consulter un vétérinaire.

A utiliser de préférence avant la date indiquée sur l'emballage. Veiller à une nutrition équilibrée.

Intensité de l'effort	T < 25°C	T > 25°C
Effort moyen, sudation modérée, transport (ou cas de cheval âgé lors de forte chaleur)	25 ml	50 ml
Effort et sudation importants (concours complet, randonnée, course...)	50 ml	50 ml à 75 ml
Effort et sudation très importants (épreuve de 150 km d'endurance, course)	50 ml à 75 ml	100 ml à 150 ml

EN QUICK LYTE is a concentrated formula of electrolytes and magnesium ensuring the proper muscle function. Palatable, it rehydrates and tones the whole horse quickly and is recommended after any situation that caused sweating and/or fatigue: training, competition, race, endurance test, hiking, transport, excessive heat, stress. Also suitable for old horses (16+) who may also lack of electrolytes and then dehydrate.

COMPOSITION: Dextrose, Sodium chloride, Monopotassium phosphate, Potassium salts of citric acid, Magnesium oxide.

ADDITIVES: Preservatives: Citric acid (1a330) 7500 mg/kg. Aromatic substances: Blend of aromatic substances.

ANALYTICAL CONSTITUENTS: Crude protein 0.2%. Crude oils and fats 0%. Crude fibres 0%. Crude ash (inorganic matter) 29%. Chlorides 18.2%. Calcium 0.01%. Sodium 6.3%. Glucose 63%. Magnesium 0.5%. Potassium 3.3%, phosphorus 3%.

INSTRUCTIONS FOR USE: Dilute QUICK LYTE in 2 to 4 liters of the first drinking water. Water should be available at all times. Needs vary from 25 ml to 150 ml according to the effort provided and surrounding temperature. Recommended length of time : 1 to 3 days after heavy sweating. It is advisable to control the subsequent water consumption, if insufficient water consumption is observed, it is advisable to consult a veterinarian.

Use preferably before the date indicated on the packaging. Ensure balanced nutrition.

LABORATOIRE **LPC**
UN PAS DE PLUS VERS LE CHEVAL

OBJECTIF NUTRITIONNEL :

COMPENSATION DE LA PERTE D'ELECTROLYTES EN CAS DE FORTE SUDATION

Compensation of electrolyte loss in the cases of heavy sweating.



QUICK LYTE

Aliment complémentaire diététique pour chevaux

Dietetic feed supplement for horses

- ✓ Concentré en électrolytes
- ✓ Récupération renforcée

PRATIQUE :
avec dosette
de mesure
PRACTICAL
TO DISTRIBUTE :
with dosing device

✓ Concentrated electrolytes

✓ Reinforced recovery

Fabriqué en France



Poids net : 1 Kg
Net Wt. 35,27 oz

ES Alimento dietético complementario para caballos.

Compensación de la pérdida de electrolitos por transpiración intensa. QUICK LYTE se recomienda después cualquier situación que haya causado sudoración o fatiga: entrenamiento, competición, carrera, resistencia, caminatas, transporte, calor excesivo, estrés. También es adecuado para caballos viejos que en climas cálidos pueden carecer de electrolitos y deshidratarse.

COMPOSICIÓN : Dextrosa, Cloruro de sodio, Fosfato monopotásico, Sales potásicas de ácido cítrico, Oxido de magnesio.

ADITIVOS : Conservadores : Acido cítrico (1a330) 7500 mg/kg. Sustancias aromáticas : Mezcla de sustancias aromáticas.

COMPONENTES Y NIVELES ANALITICOS : Proteína bruta 0,2%. Aceites y grasas brutas 0%. Fibras brutas 0%. Cenizas brutas (materia inorgánica) 29%. Cloruros 18,2%. Calcio 0,01%. Sodio 6,3%. Glucosa 63%. Magnesio 0,5%. Potasio 3,3%, fósforo 3%.

MODO DE EMPLEO : Diluya QUICK LYTE en 2 a 4 litros del primer agua potable. Los animales deberán tener acceso permanente al agua. La cantidad a administrar varía de 25 ml a 150 ml en función del esfuerzo realizado y de la temperatura ambiente. Periodo de utilización recomendado : 1 a 3 días después de sudar mucho. Es recomendable controlar el consumo de agua posterior, si se observa un consumo de agua insuficiente, es recomendable consultar a un veterinario. Usar preferentemente antes de la fecha indicada en el envase.

NL Aanvullende dietvoeding voor paarden.

Compensatie van verlies aan elektrolyten bij hevige zweten. QUICK LYTE wordt aanbevolen na elke situatie die zweten of vermoeidheid heeft veroorzaakt: training, competitie, hardlopen, uithoudingsvermogen, wandelen, transport, overmatige hitte, stress.

SAIENSSTELLING: Dextrose, Natriumchloride, Monokaliumfosfaat, Kaliumzouten van citroenzuur, Magnesiumoxide.

ADDITIEVEN: Conservatiemiddelen: Citroenzuur (1a330) 7500 mg/kg. Aromatische stoffen: Mengsel van aromatische stoffen.

ANALYTISCH BESTANDDELEN: Ruw eiwit 0,2%. Ruw vet 0%. Ruwe celstof 0%. Ruwe as (anorganische stof) 29%. Chloriden 18,2%. Calcium 0,01%. Natrium 6,3%. Glucose 63%. Magnesium 0,5%. Kalium 3,3%. fosfor 3%.

GEBRUIKSAANWIJZING: Verdun QUICK LYTE in 2 tot 4 liter van het eerste drinkwater. Er moet altijd water beschikbaar zijn. De toe te dienen hoeveelheden variëren van 25 ml tot 150 ml, afhankelijk van de geleverde inspanning en de omgevingstemperatuur. Aanbevolen gebruiksduur: 1-3 dagen na hevige zweten. Het is raadzaam om het daaropvolgende waterverbruik te beheersen, indien onvoldoende waterverbruik wordt geconstateerd, is het raadzaam een dierenarts te raadplegen. Gebruik bij voorkeur vóór de datum vermeld op de verpakking. Zorg voor een evenwichtige voeding.



LABORATOIRE LPC - CENTRAL T
Rue Arago - 59930 La Chapelle-d'A mentières
Tél. : +33(0)3 59 61 17 13
www.laboratoirelpc.com
contact@laboratoirelpc.com

N° d'agrément fabricant n° FR 22 171 012

